

A photograph of a dirt path curving through a lush green field. In the background, there is a dense line of trees. The sky is bright and overcast. The text is overlaid on the image in a green, sans-serif font.

Etape *Verte*

Face à la prairie


Les érables - Les aulnes
Les graminées
Les légumineuses

Erable plane

Acer platanoides

Fleurs d'un jaune rougeâtre paraissant avant les feuilles

Feuilles à long pétiole, à 5 lobes bordés de dents pointues et séparés de sinus arrondis



Ailes accolées en angle obtus


Sinus arrondis

Dents pointues

Originnaire de l'Europe du centre et du nord, l'Erable plane est très beau en avril lorsque ses fleurs s'ouvrent et en automne, période où son feuillage vire au jaune cuivré. Bonne adaptation aux sites urbains.

Erable champêtre


Acer campestre



L'Erable champêtre est un arbre qui a colonisé les bois, les broussailles, les haies. Son écorce brun pâle, écailleuse se fissure avec l'âge.

Aulne glutineux


Alnus glutinosa



*Les Aulnes poussent sur des terrains humides.
 Les racines profondes protègent les berges de rivière et améliorent le sol avec leur nodules fixant l'azote.
 Leurs cônes ligneux à maturité lâchent les fruits en octobre.
 Leurs graines flottantes sont ainsi disséminées par l'eau.*

Aulne blanc

Alnus incana



L'Aulne blanc est largement répandu dans les montagnes de l'est de la France. On le reconnaît à ses jeunes rameaux pubescents et à l'envers duveteux de ses feuilles.

Houlque laineuse

Holcus lanatus

Forme une panicule lâche
verte avec une nuance
violacée.

Glumelles à arête courte,
à peine saillante.



Tige et feuilles finement
et densément velues

Graminée. 30 à 70 cm de haut.
Plante vivace, assez envahissante.
Fourrage de qualité médiocre.
Fleurit en juin et en juillet.
Répandue partout.

Fétuque roseau

Festuca arundinacea



Graminée.

Plante à touffe à grandes feuilles (40 cm) coriaces, striées et à oreillettes de la base du limbe ciliées.

Bonne plante fourragère malgré sa consistance coriace.

Trèfle blanc

Trifolium repens



Tige couchée s'enracinant aux nœuds, ce qui assure la propagation de l'espèce. Fleurs en glomérules portées par un pédoncule de 5 à 10 cm, à corolle blanche, les inférieures réfléchies vers le bas. Bonne plante fourragère des prairies pâturées et des gazons. Très mellifère.

Gesse des prés

Lathyrus pratensis

Fleurs jaunes,
en grappes
longuement
pédunculées.

Feuilles à
2 folioles,
terminées
par une
vrille

Tige molle

Pétiole
légèrement ailé

Famille des papilionacées.

Gousse noire de 3 cm.

Pousse dans les prairies et les friches.

Fleurit de juin à août.

Oseille acide

Rumex acetosa



Tige atteignant 1 mètre de haut, garnie de feuilles à 2 pointes dirigées vers le bas. Fleurs minuscules, vertes à rougeâtres.

La plante contient de l'acide oxalique, comme la rhubarbe dont elle est parente.

Très commune dans les prairies. Fleurit en mai et en juin.